

Todavía tengo estilo.
Todavía tengo fuerzas.
Todavía tengo ganas.

Todavía
lo
tengo.

Debbie
USA RYTARY
DESDE 2015

No permito que el Parkinson me defina. Por eso uso RYTARY, porque me da menos periodos "OFF" y más periodos "ON" para hacer lo que amo.

Los resultados de cada paciente pueden variar.

Si siente que los periodos "OFF" definen su tiempo, **RYTARY** puede ayudarlo.

INDICACIÓN

Las cápsulas de liberación prolongada RYTARY (carbidopa y levodopa) son un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson ocasionada por una infección o inflamación del cerebro, o síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

RYTARY no debe tomarse con los medicamentos antidepresivos conocidos con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

Si está teniendo periodos “OFF”, RYTARY puede ayudarlo.

Ya sea que convive con la enfermedad de Parkinson hace tiempo, se la diagnosticaron recientemente, o está al cuidado de alguien que padece la enfermedad, probablemente esté familiarizado con los términos periodos “ON”, “Good ON” y “OFF”.

- **Los periodos “ON”** ocurren cuando los síntomas están bajo control.
- **Los periodos “Good ON”** ocurren cuando no experimenta movimientos que no puede controlar, también conocidos como disquinesia, o si los experimenta, no están afectando sus actividades diarias.
- **Los periodos “OFF”** ocurren cuando aparecen los síntomas o cuando estos regresan entre dosis.

Manejar la enfermedad de Parkinson implica optimizar los periodos “ON” y reducir los periodos “OFF”.

- **La carbidopa/levodopa (CD/LD) de liberación inmediata**, un medicamento habitual para el Parkinson, funciona con rapidez pero, por lo general, no es de larga duración.
- **La CD/LD de liberación controlada** libera levodopa más lentamente, pero no es más eficaz que la CD/LD de liberación inmediata y demora más en empezar a funcionar.
- **La CD/LD de liberación prolongada** contiene componentes tanto de liberación inmediata como prolongada, lo que le permite funcionar rápidamente y mantener los niveles de levodopa por más tiempo.

A diferencia de la CD/LD de liberación inmediata y controlada, RYTARY es la única opción de CD/LD de liberación prolongada disponible para personas con Parkinson.

Recuerde: Si no es RYTARY, no es de liberación prolongada.


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

RYTARY podría causarle adormecimiento mientras realiza sus actividades habituales, incluso sin previo aviso, y hasta un año después de haber comenzado RYTARY. Esto podría afectar su capacidad para conducir u operar una máquina. No realice ninguna actividad para la que deba estar alerta hasta que conozca los efectos que RYTARY produce en usted.



June
USA RYTARY
DESDE 2022

“ En comparación con la CD/LD de liberación inmediata que solía tomar, RYTARY me hace sentir bien por más tiempo. ”



Dr. Falconer, MD
Especialista en Trastornos del Movimiento

Para conocer los motivos por los que el médico de June, el Dr. Drew Falconer, especialista en trastornos del movimiento, elige RYTARY, coloque la cámara de su celular sobre este código QR o visite RYTARY.com.



Los resultados de cada paciente pueden variar. Las personas que aparecen en este folleto fueron patrocinadas por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y los resultados que usted tenga pueden variar.


Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

RYTARY comienza a funcionar rápidamente y continúa actuando por más tiempo


A diferencia de la CD/LD de liberación inmediata y controlada, cada cápsula de RYTARY contiene una combinación exclusiva de microesferas de liberación programada.

1/3 de las microesferas de CD/LD son de liberación inmediata, lo que permite que RYTARY comience a actuar rápidamente



1/3 DE LIBERACIÓN INMEDIATA

2/3 de las microesferas de CD/LD son de liberación prolongada lo que, al combinarse con las microesferas de liberación inmediata, permite que RYTARY actúe durante 4 a 5 horas



2/3 DE LIBERACIÓN PROLONGADA

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)


Informe a su profesional médico si tiene alguna enfermedad coronaria, en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o siente latidos del corazón irregulares; si experimenta alucinaciones, pensamientos y conductas anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en cosas que no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo y pensamiento desorganizado); si siente deseos intensos de apostar, tener relaciones sexuales u otros deseos intensos así como la incapacidad de controlar estos deseos; si comienza a realizar movimientos involuntarios anormales o si estos se agravan durante el tratamiento con RYTARY; o si tuvo úlcera péptica o glaucoma.

RYTARY dura más tiempo que otros tratamientos con CD/LD, incluida la CD/LD de liberación controlada.

La mayoría de los tratamientos con CD/LD no pueden mantener niveles sostenidos del medicamento en el organismo; esto significa que las personas que los toman pueden necesitar dosis diarias más frecuentes.

Sin embargo, cuando un estudio comparó a RYTARY con otros tratamientos con CD/LD, **RYTARY mantuvo niveles sostenidos de LD por más tiempo (alrededor de 5 horas), por lo que superó a Sinemet®, Sinemet® de liberación controlada (CR), y Stalevo®.**

Sinemet® duró	Sinemet® CR duró	Stalevo® duró*	RYTARY duró*
alrededor de 1,5 horas	alrededor de 2 horas	alrededor de 2 horas	alrededor de 5 horas



*Duración de concentraciones de LD superiores al 50% C_{max} (h).

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

Tener más periodos “ON” y menos periodos “OFF” puede ayudar a que despierte su verdadero yo.

En otro estudio clínico se comparó la efectividad de RYTARY con la de CD/LD de liberación inmediata en personas con enfermedad de Parkinson avanzada. Las personas que cambiaron de CD/LD de liberación inmediata a RYTARY durante este estudio experimentaron:

2X más de reducción del periodo “OFF” durante las horas de vigilia

- Después de cambiar a RYTARY, las personas experimentaron una reducción significativa en el periodo “OFF”, en comparación con la CD/LD de liberación inmediata
 - 13,1% de reducción del periodo “OFF” con RYTARY frente a 6,2% con CD/LD de liberación inmediata
 - Porcentaje del periodo “OFF” al comienzo y al término del estudio, respectivamente: 36,9 y 23,8 con RYTARY, frente a 36,0 y 29,8 con CD/LD de liberación inmediata*

2X más de aumento del periodo “ON” sin molestias de disquinesia a lo largo del día†

- Después de cambiar a RYTARY, las personas experimentaron un aumento significativo en el periodo “ON” sin molestias de disquinesia (también conocidos como periodos “Good ON”), en comparación con la CD/LD de liberación inmediata
 - 1,8 horas con RYTARY frente a 0,8 horas con CD/LD de liberación inmediata‡

La disquinesia ocurre cuando su medicamento está funcionando, pero usted experimenta movimientos involuntarios que no puede controlar, como espasmos, sacudidas y movimientos de torsión.

Mejor control de movimientos†

- Mejor desempeño de las funciones motoras y las actividades diarias*

*Fin del estudio=Semana 22 o terminación temprana; $P < 0,0001$ frente a CD/LD de liberación inmediata.

†Estas fueron medidas secundarias del estudio.

‡ $P = 0,0002$ frente a CD/LD de liberación inmediata.



Si está teniendo periodos “OFF”, quizás sea momento de avisarle a su médico. **Responda las preguntas de la página 9** junto con su ser querido. Al pensar juntos en las respuestas, podrán confirmar si RYTARY podría ser la opción adecuada para usted.

Efectos secundarios comunes

En un estudio clínico, los efectos secundarios más comunes que se observaron en al menos el 3% de los pacientes tratados con RYTARY o con CD/LD de liberación inmediata en el periodo de mantenimiento de doble ciego fueron insomnio (3% en comparación con 1%), náuseas (3% en comparación con 2%), caídas (3% en comparación con 2%) y depresión (<1% en comparación con 3%). También puede producirse somnolencia excesiva.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden ocurrir con RYTARY son náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, sueños anormales, sequedad bucal, movimientos anormales involuntarios, ansiedad, estreñimiento, vómitos y baja presión arterial al levantarse.


Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

En un análisis retrospectivo*, cada dosis duró más con RYTARY.

Un análisis diferente del mismo estudio comparó cuántas más horas de periodos "ON" experimentaban, en promedio, las personas con cada dosis de RYTARY en comparación con cada dosis de CD/LD de liberación inmediata.

Según el estudio, RYTARY les proporcionaba a las personas 1,2 horas más de periodos "ON" por dosis, en promedio, que CD/LD de liberación inmediata.†



Además, las personas que tomaron RYTARY experimentaron, en promedio, 1,2 horas más por dosis de periodo "ON" sin molestias de disquinesia (también conocidos como periodos "Good ON"), en comparación con CD/LD de liberación inmediata.‡

* $P < 0,0001$ frente a CD/LD de liberación inmediata.

†Horas de periodo "ON" por dosis al punto de referencia y al término del estudio, respectivamente: 2,17 y 3,55 con RYTARY, en comparación con 2,24 y 2,38 con CD/LD de liberación inmediata ($P < 0,0001$).

‡Horas de periodo "ON" sin molestias de disquinesia por dosis al punto de referencia y al término del estudio, respectivamente: 2,10 y 3,41 con RYTARY, en comparación con 2,17 y 2,29 con CD/LD de liberación inmediata ($P < 0,0001$).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Algunos pacientes que toman RYTARY han experimentado pensamientos suicidas o han intentado suicidarse. Infórmele a su profesional médico si tiene pensamientos suicidas o si ha intentado suicidarse.

¿Es RYTARY una buena opción para mí?

Tomando en cuenta la información que ha aprendido hasta ahora, hágase las siguientes preguntas. Si usted es un acompañante terapéutico, siéntese junto a su ser querido y respondan juntos estas preguntas. **Cuando haya terminado, lleve este folleto a su próxima consulta con el médico.**

	Sí	No	No estoy seguro/a
¿Los periodos "OFF" le impiden predecir cómo será el día?			
¿La enfermedad de Parkinson le impide hacer planes o realizar sus actividades diarias?			
¿Siente que los efectos de cada dosis de su medicación o la de su ser querido desaparecen más rápidamente que antes?			
¿Está experimentando nuevos síntomas motores relacionados con la enfermedad de Parkinson (como lentitud de movimiento o temblores) o siente que los síntomas que ya tenía están empeorando?			
¿Podría yo o mi ser querido beneficiarnos de una opción de tratamiento que dure más que otros medicamentos con CD/LD?			

Si respondió "sí" a una o más de estas preguntas, o si no está seguro de si sus síntomas están relacionados con el periodo "OFF", quizás sea momento de consultar a su médico acerca de RYTARY.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

Obtener su receta de RYTARY ¡es tan simple como contar 1, 2, 3!

BlinkRx hace que obtener sus cápsulas de liberación prolongada RYTARY sea fácil. Los beneficios comienzan una vez que su profesional médico envíe una receta para RYTARY a BlinkRx. Aquí le explicamos cómo funciona:



Paso 1: BlinkRx se pondrá en contacto con usted

- Cuando su profesional médico envíe una receta a BlinkRx, uno de sus agentes se comunicará con usted.
 - También puede comunicarse directamente con BlinkRx llamando al 833-984-2820.



Paso 2: Pague en línea

- BlinkRx trabaja con su compañía de seguro médico para aplicar todos los descuentos elegibles a su copago.
- Cuando llegue el momento de pagar, podrá hacerlo en línea o por teléfono.
 - También puede registrarse para resurtidos automáticos
- Confirme su dirección de envío



Paso 3: RYTARY se entrega directamente en su casa

- Si su compañía de seguro médico requiere aprobación de autorización previa, usted podría recibir RYTARY sin cargo durante 30 días.
 - La entrega siempre es gratuita.
 - No se exige firma.
 - BlinkRx le dará un número de seguimiento para la entrega.

En promedio, los pacientes elegibles de RYTARY se ahorran \$90 mensuales con BlinkRx.

BLINKRx

Para obtener más información, **póngase en contacto con BlinkRx llamando al 833-984-2820**. RYTARY también está disponible en su farmacia local.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Infórmele a su profesional médico si queda embarazada o si tiene pensado quedar embarazada durante la terapia, o si tiene pensado amamantar o está amamantando a un bebé.

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocar efectos secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como fiebre, confusión o rigidez muscular severa.

Tome RYTARY según las instrucciones. Usted puede tomar RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades de la cápsula sobre una pequeña cantidad de puré de manzana (1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No debe conservarse la mezcla del medicamento con el alimento para utilizarla más tarde.

Nota: Esta información tiene como finalidad ayudar a usar RYTARY de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación sobre todos los posibles efectos adversos o deseados. Comuníquese a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar el medicamento para reducir esos efectos.

Para informar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472, o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

¿RYTARY puede ser la opción adecuada para usted?

Recuerde: Si no es RYTARY, no es de liberación prolongada.

- RYTARY es la única opción de CD/LD de liberación prolongada disponible para personas con Parkinson. **RYTARY mantuvo los niveles de LD por más tiempo que otras opciones de tratamiento de CD/LD por vía oral**, incluidos CD/LD de liberación inmediata y CD/LD de liberación controlada.
- En un estudio clínico, RYTARY brindó **2 veces más de reducción del periodo “OFF”** y **2 veces más de aumento del periodo “ON”** sin molestias de disquinesia y con **mejor control de movimientos, en comparación con CD/LD de liberación inmediata**.
- En un análisis retrospectivo, RYTARY proporcionó **1,2 horas más de periodos “ON” por dosis** en promedio, comparado con CD/LD de liberación inmediata.
- **Ahorre tiempo y dinero** en su receta de RYTARY con BlinkRx.

Efectos secundarios comunes

En un estudio clínico, los efectos secundarios más comunes que se observaron en al menos el 3% de los pacientes tratados con RYTARY o con CD/LD de liberación inmediata en el periodo de mantenimiento de doble ciego fueron insomnio (3% en comparación con 1%), náuseas (3% en comparación con 2%), caídas (3% en comparación con 2%) y depresión (<1% en comparación con 3%). También puede producirse somnolencia excesiva.

Si le interesa obtener más información sobre RYTARY, escanee este código QR para registrarse.



Consulte la Información importante de seguridad en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.



RYTARY® es una marca registrada de Amneal Pharmaceuticals LLC.
© 2023 Amneal Pharmaceuticals LLC. Distribuida por Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC.
Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. PP-PAT-RYT-US-0317 12/2023

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg