


Un buen comienzo con RYTARY

En esta práctica guía de bolsillo, usted encontrará la información más importante sobre cómo comenzar su nuevo tratamiento.



INDICACIÓN

RYTARY es un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson ocasionada por infección o inflamación del cerebro, o síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

RYTARY no debe tomarse con una clase de medicamentos antidepresivos conocidos con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

RYTARY podría causar adormecimiento repentino al realizar sus actividades habituales, incluso sin previo aviso y hasta un año después de haber comenzado a tomar RYTARY. Tomar RYTARY junto con otros sedantes y alcohol podría ocasionar efectos sedativos adicionales. Comuníquese a su profesional médico si tiene cualquier clase de trastorno del sueño o siente somnolencia o adormecimiento.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg



RYTARY actúa diferente
a como lo hacen los
tratamientos de liberación
inmediata (IR, en inglés).

Si bien RYTARY es una combinación de carbidopa (CD) y levodopa (LD), es una forma de liberación prolongada de la medicación.

Esto significa que, a diferencia del tratamiento de liberación inmediata con CD/LD (que actúa rápidamente, pero es posible que no actúe por mucho tiempo), cada dosis de RYTARY actúa rápidamente y sigue haciéndolo durante 4 a 5 horas. Esto puede reducir el periodo "OFF".

Dicho esto, es posible que su dosis inicial de RYTARY deba ajustarse, por lo que es importante mantener informado a su profesional médico tan pronto y con tanta frecuencia como sea posible acerca de sus avances.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Algunos efectos secundarios de RYTARY, incluidos la somnolencia y los mareos, pueden afectar su capacidad para conducir u operar una máquina. No conduzca un automóvil, ni opere una máquina, ni realice ninguna actividad para la que deba estar alerta, hasta que conozca los efectos que RYTARY produce en usted.



Es posible que
su profesional
médico deba ajustar
su dosis.

Puede que sea necesario ajustar su dosis durante su tratamiento con RYTARY. Mientras que a algunas personas la primera dosis de RYTARY les funciona perfectamente, otras necesitan ajustarla.

Pero para que su profesional médico encuentre la dosis justa para usted, necesita de su transparencia y honestidad para saber cómo está.

Hablar sobre su reacción al tratamiento con su profesional médico permite obtener los mejores resultados posibles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocarle efectos secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como fiebre, confusión o rigidez muscular severa.



Encontrar la
dosis justa de
RYTARY puede
llevar tiempo.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

El objetivo es encontrar la dosis de RYTARY que le permita sentir que todavía es usted, que todavía lo tiene.

Sus primeros días y semanas con RYTARY son especialmente importantes, porque puede que su cuerpo necesite tiempo para ajustarse a la nueva medicación. Ponga mucha atención a lo que su cuerpo le está diciendo e informe a su profesional médico sobre sus avances. Preste especial atención si experimenta:

- Largos periodos "OFF"
- Una demora del periodo "ON"
- Mucha disquinesia

Si no tiene la experiencia que esperaba con RYTARY, hágaselo saber a su profesional médico inmediatamente.

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)

EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Asegúrese de informarle a su profesional médico si tiene alguna enfermedad coronaria, en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o siente latidos del corazón irregulares. Algunas personas con antecedentes o factores de riesgo de enfermedad coronaria han sufrido problemas cardíacos durante el tratamiento con RYTARY.

Algunos pacientes que toman RYTARY pueden experimentar alucinaciones (visiones, sonidos o sensaciones irreales) o pensamientos y conductas anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en cosas que no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo y pensamiento desorganizado). Si tiene alucinaciones o pensamientos o conductas anormales, hable con su profesional médico.

Algunos pacientes que toman ciertos medicamentos para tratar la enfermedad de Parkinson sienten ansias internas de apostar, un mayor deseo sexual y otros impulsos intensos, e incapacidad para controlarlos. Si usted o los miembros de su familia advierten que usted está teniendo impulsos o conductas inusuales, hable con su profesional médico.

Informe a su profesional médico si comienza a realizar movimientos involuntarios anormales o si estos se agravan durante el tratamiento con RYTARY.

Informe a su profesional médico si tuvo úlcera péptica alguna vez, pues RYTARY podría aumentar las probabilidades de sangrado estomacal.

Informe a su profesional médico si tiene glaucoma, dado que RYTARY podría aumentar su presión ocular.

Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un riesgo más elevado de desarrollar melanoma, una forma de cáncer de piel. Consulte a su profesional médico para someterse a exámenes de piel periódicos durante el tratamiento con RYTARY.

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden ocurrir con RYTARY son náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, sueños anormales, sequedad bucal, movimientos anormales involuntarios, ansiedad, constipación, vómitos y baja presión arterial al levantarse. Después de un periodo prolongado de estar sentado o recostado, levántese lentamente.

Después del uso en el mercado, algunos pacientes que toman RYTARY han experimentado pensamientos suicidas o han intentado suicidarse. No se ha establecido una relación causal. Informe a su profesional médico si tiene pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse.

Informe a su profesional médico si queda embarazada o si tiene pensado quedar embarazada durante la terapia, o si tiene pensado amamantar o está amamantando a un bebé.

Se han denunciado efectos adversos por sobredosis involuntaria de esta medicación. Si accidentalmente toma una dosis más alta que la dosis indicada, comuníquese con su profesional médico inmediatamente.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Asegúrese de informar a su profesional médico todos los medicamentos recetados y de venta libre que usted toma, incluidos suplementos, y en especial aquellos para tratar enfermedad de Parkinson, cardiopatía, presión arterial, pensamientos anormales, tuberculosis y trastornos del sueño, y los suplementos que contengan hierro. No tome otras presentaciones de carbidopa-levodopa junto con RYTARY sin consultar a su profesional médico.

Asegúrese de seguir las instrucciones al tomar la medicación. Usted puede tomar RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades de la cápsula sobre una

pequeña cantidad de puré de manzana (1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No conserve la mezcla del medicamento con el alimento para utilizarla más tarde.

Nota: El objetivo de la información para pacientes en tratamiento con RYTARY que se incluye anteriormente tiene como finalidad ayudarlos a usar este medicamento de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación sobre los posibles efectos adversos o no deseados. Comuníquese a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar la medicación para reducir estos efectos.

Para denunciar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472 o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS? HABLE CON SU PROFESIONAL MÉDICO O VISITE RYTARY.COM



RYTARY® es una marca registrada de Impax Laboratories, LLC.

© 2019 Amneal Pharmaceuticals LLC.

Distribuida por Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC.

Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. PP-PAT-RYT-US-0174 09/2019

RYTARY®
(carbidopa and levodopa)

EXTENDED-RELEASE CAPSULES

23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg

48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg